

Slegs Vir Dieregebruik

CattleMaster 4

Reg Nr G 2016 Wet 36/1947

Namibie reg. Nr. NSR 1061

INDIKASIES

CattleMaster 4 is vir die inenting van gesonde beeste, insluitende dragtige koeie, as 'n hulpmiddel in die voorkoming van infeksies deur Besmetlike Bees Rhinotracheïtis (BBR), Para-influenza₃(PI₃), Bees Virusdiaree (BVD) en Bees Respiratoriese Sinsitiale Virus (BRSV).

BERGING

Berg tussen 2 ° C tot 7 ° C. Moet nie bevries nie. Langdurige blootstelling aan hoër temperature mag die doeltreffendheid nadelig beïnvloed

SAMESTELLING

CattleMaster 4 is 'n gevriesdroogte voorbereiding van chemise-veranderde stamme van BBR en PI₃ virusse asook gemodifiseerde lewende BRSV plus 'n vloeistof komponent bevattende ge-adjuvante sitopatische en nie-sitopatische BVD virus stamme. Die vloeistof component word gebruik vir die oplos van die gevriesdroogte component. Die virusfraksies is gepropageer op 'n reeds bestaande selllyn. Die produk bevat verder 'n adjuvant om die immunreaksie te versterk.

WAARSKUWINGS:

Moet nie inent binne 21 dae voor slag nie..

Hou buite die bereik van kinders en oningeligte persone.

Indien anafilakse of hipersensitiwiteit na gebruik voorkom, dien adrenalien of ekwivalent toe. Sonder sodanige behandeling mag erge reaksies lei tot die dood.

Hierdie produk is doeltreffend bewys maar sommige diere mag nie in staat wees om 'n voldoende immunreaksie te ontwikkel of te onderhou na inenting nie. Dit mag gebeur as hulle bv. Blywend besmet is met BVD virus, enige ander besmetlike siekte inkubeer, ondervoed, geparasiteer of gestres is deur vervoer of swak omgewingstoestande.

Alhoewel hierdie entstof breedvoerige onder 'n wye verskeidenheid van toestande getoets word, mag dit faal a.g.v. verskeie redes. Indien dit vermoed word raadpleeg 'n veearts en virwittig die registrasiehouer..

VOORSORGMATREËLS:

Geruik die totale inhoud anadat eers ooggemaak is..

Gesteriliseerde spuite en naald moet gebruik word om die entstof mee toe te dien. Moet nie steriliseer met chemikalieë nie aangesien spore van die ontsmettingsmiddel die entstof mag inaktiveer.

Verbrand houers en alle ongebruikte inhou.

Contains gentamycin as preservative

DOSIS EN GEBRUIKSAANWYSINGS:

Algemene Aanwysings:: Die inenting van gesonde beeste word aanbeveel. Rehidreer asepties die gevriesdroogte component met die voestofkomponent en dien 2 ml binnespeers..

Primêre inenting: Twee dosisse word aanbeveel 2 tot 4 weke uitmekaar. Om moontlike belemmering van aktiewe immunisering deur maternale teëliggame te vermy, moet kalwers wat voor die ouderdom van 6 maande ingeënt is, weer op die bereiking van 6 maande ngeënt word.

Nerinenting: Jaarlikse met 'n enkele 2 ml dosis word aanbeveel.

AANBIEDING:

25 X 2 ml dosis in twee flessies

REGISTRASIEHOUER:

Pfizer Laboratories (Pty) Ltd

(Reg. Nr. 1954/000781/07)

Bute Laan 85, Sandton, 2196

Posbus 783720, Sandton, 2146

Vir meer inligting skakel 011 320 6000

CattleMaster en die Pfizer Logo is Registeerde Handlesmerk