

SLEGS VIR DIEREGERBRUIK

VALBAZEN® ULTRA

Reg. Nr. G2037 (Wet 36/1947)

Rondewurm-, Longwurm- en Melklintwurm-middel vir Beeste, Skape en Bokke asook Lewerslakwurm-middel vir Skape en Bokke.

DOELTREFFENDHEID

Hierdie lys bevat die belangrikste endoparasiet spesies. Die ontwormingsmiddel mag ook effektief wees teen ander spesies. Vir verdere inligting, kontak u veearts.

1. RONDEWURMDOELTREFFENDHEID:

Soort	Onvolwassenes	Volwassenes
Haarwurm	*	*
Bruinmaagwurm	*	*
Beesbankrotwurm	*	*
Haakwurm	*	*
Knoppieswurm	*	*
Longwurm	*	*

Verduideliking: *Beheer (≥ 90 % effektief)

2. LINTWURMDOELTREFFENDHEID:

Melklintwurm (<i>Moniezia</i> spp.)	Klas 1
--------------------------------------	--------

Verduideliking: Klas 1: 100 % doeltreffend in meer as 80 % van die behandelde kudde.

3. **Eierdodend:** Verhoed dat rondewurmeiers wat tydens dosering in die dier teenwoordig is, uitbroei.

SKAPE EN BOKKE:

Dosis: Verdun 1 deel (bv 2 liter) Valbazen Ultra met 3 dele (bv 6 liter) skoon water en doseer teen 'n koers van 2 ml/10 kg lewende massa, bv.

Massa	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg
Dosis	4 ml	6 ml	8 ml	10 ml
Aantal dosisse per pak	2000	1333	1000	800

DOELTREFFENDHEID

Hierdie lys bevat die belangrikste endoparasiet spesies. Die ontwormingsmiddel mag ook effektief wees teen ander spesies. Vir verdere inligting, kontak u veearts.

1. RONDEWURMDOELTREFFENDHEID:

Soort	Onvolwassenes	Volwassenes
Haarwurm	*	*
Bruinmaagwurm	*	*
Bankrotwurm	*	*
Langnekbankrotwurm	*	*
Haakwurm	*	*
Knoppieswurm	*	*
Grootbekwurm	*	*
Longwurm	*	*

Verduideliking: * Beheer (≥ 90 % effektief)

2. Melklintwurmdoeltreffendheid:

Melklintwurm (<i>Moniezia</i> spp.)	Klas 1
--------------------------------------	--------

Verduideliking: Klas 1: 100 % doeltreffend in meer as 80 % van die behandelde trop.

Dosis vir Lewerslakwurm (na verdunning): 2,5 ml per 10 kg lewende massa, bv.

Massa	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg
Dosis	5 ml	7,5 ml	10 ml	12,5 ml
Aantal dosisse	1600	1066	800	640

3. Lewerslakwurmdoeltreffendheid: Hulpmiddel in beheer van volwasse lewerslakwurm (*Fasciola hepatica* en *F.gigantica*).

Verduideliking: Hulpmiddel in beheer (60 % - 89 % effektief)

4. Eierdodend: Verhoed dat rondewurmeiers wat tydens dosering in die dier teenwoordig is, uitbroei.

PRODUK

Bevat: Albendasool 7,6 % m/v.

VOORSORGMAATREËLS

VERSIGTIG; Bêre in 'n koel plek.

WAARSKUWINGS:

DIE MELK IS NIE GESKIK VIR MENSlike GEBRUIK, OF VIR ENIGE VERVAARDIGINGSPROSES, OF MAG NIE GEMENG WORD MET NORMALE MELK BINNE 72 UUR NA DOSERING NIE. BEESTE MOENIE BINNE 12 DAE EN SKAPE EN BOKKE BINNE 10 DAE NA DOSERING VIR MENSlike VERBRUIK GESLAG WORD NIE.

Hou buite bereik van kinders, oningeligte persone en diere.

Die verdunde produk mag nie na 6 weke gebruik word nie.

Bestuurspraktyke behoort altyd te verseker dat alle dosering versigtig uitgevoer word. Dit is veral belangrik om nie gedurende paring en die eerste maand van dragtigheid die aanbevole dosis te oorskry nie.

Dit word aanbeveel dat alle skape en bokke teen bloednier geënt word voordat dosering met enige wurmmiddel plaasvind.

Alhoewel hierdie middel breedvoerig onder 'n wye verskeidenheid van toestande getoets is, mag dit faal as gevolg van verskeie redes. Indien dit vermoed word, raadpleeg 'n veearts en verwittig die registrasiehouer.

DOSIS EN GEBRUIKSAANWYSINGS

Skud goed voor gebruik.

Vir skape en bokke, verdun eers 1 deel Valbazen Ultra met 3 dele skoon water voor gebruik.

BEESTE: Dosis: Die dosis is 1 ml per 10 kg lewende massa, bv:

Massa	100 kg	150 kg	200 kg	250 kg	300 kg
Dosis	10 ml	15 ml	20 ml	25 ml	30 ml
Aantal dosisse per pak	200	133	100	80	66

REGISTRASIEHOUER:

Pfizer Laboratories (Pty) Ltd

Reg. Nr. 1954/00781/07

85 Bute Lane

SANDTON

2196

Tel.(011) 320 6000